

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України,  
Міністерства освіти і науки України,  
Міністерства України у справах сім'ї,  
молоді та спорту,  
Державного департаменту України  
з питань виконання покарань,  
Міністерства праці та соціальної  
політики України  
23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614a

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
26 грудня 2007 р.  
за № 1405/14672

Додаток 9  
до підпункту 4.3.9 пункту 4.3  
Інструкції про порядок  
профілактики передачі ВІЛ від матері  
до дитини

**АЛГОРИТМ**  
**ранньої діагностики та виключення діагнозу ВІЛ-інфекції у дітей,**  
**народжених ВІЛ-інфікованими матерями**

Дитина, народжена ВІЛ-інфікованою жінкою, – дитина з неуточненим ВІЛ-статусом (Z 20.6, R 75)

Тестування пуповинної крові на антитіла до ВІЛ методом

**Позитивний  
результат**

Перше тестування методом ПЛР у віці 1 – 2  
місяців

**Позитивний  
результат**

**Негативний  
результат**

Повторне тестування методом ПЛР через  
1 – 2 тижні після першого забору крові до  
отримання двох однакових результатів

Повторне тестування методом ПЛР у віці 3 – 4 місяців  
за відсутності показів до дослідження раніше до  
отримання двох однакових результатів

**Позитивний  
результат**

**Негативний  
результат**

Два позитивних результати визначення  
генетичного матеріалу ВІЛ методом ПЛР –  
дитина ВІЛ-інфікована

Два негативних результати визначення генетичного матеріалу  
ВІЛ методом ПЛР – дитина не інфікована ВІЛ

Припинення диспансерного спостереження та зняття з обліку за місцем проживання на підставі одного негативного результату визначення антитіл до ВІЛ методом ІФА у віці 18 – 19 місяців (за умови відсутності проявів III чи IV клінічної стадії ВІЛ-інфекції та відсутності грудного вигодовування в останні 6 місяців)